

Dokumenttyp Instruktion	Ansvarig verksamhet Hälso- och sjukvård	Version 6	Antal sidor 3
Dokumentägare Eric Le Brasseur Utvecklingsledare Område öppenvård	Fastställare Lena Gjevort Hälso- och sjukvårdsdirektör	Giltig fr.o.m. 2022-01-04	Giltig t.o.m. 2024-01-04

Algoritm för bedömning om vaccination mot covid-19 kan ske vid allergi

Gäller för: Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd Regional vaccinationsenhet covid-19

Syfte

Denna algoritm utgör ett stöd för läkare att bedöma om vaccination mot covid-19 av personer från 12 år och uppåt kan ske vid allergi. Algoritmen gäller de vaccin mot covid-19 som används idag: Comirnaty (Pfizer-BioNTech) och Spikevax (Moderna).

Bakgrund

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar svåra allergiska reaktioner hos cirka 1 på 100 000 individer som vaccineras mot covid-19. Ett misstänkt ämne är dock polyetylenglykol (PEG) som finns i de två mRNA vaccinerna.

Under den pågående vaccinationen mot covid-19 är det sannolikt att allergiska reaktioner kommer att uppstå utifrån det stora antal personer som vaccineras.

Hälsodeklarationen som fylls i vid bokning av vaccination innehåller två frågor om anafylaxi och allergi som krävt sjukhusvård:

- *Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination och behövt sjukhusvård?*
- *Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner som du har behövt sjukhusvård för?*


Om någon av dessa frågor besvaras med *Ja* kommer personen att få en telefontid till läkare vid tidsbokningen för bedömning.

Med kraftig allergisk reaktion avses reaktion som är så svår att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

Bedömning

Möjliga utfall i algoritmen är

- Att personen inte ska vaccineras
- Att personen ska vaccineras på sjukhus med narkosläkarberedskap
- Att personen kan vaccineras som vanligt
- Att personen kan vaccineras med förlängd observationstid (30 i stället för 15 minuter) och möjlighet till syrgas och intravenös vätskebehandling utöver vanlig anafylaxiberedskap



Övrigt

Anafylaxiberedskap ska finnas överallt där vaccinerna ges, se RUT-21816 och RUT-21027.

Ge inte antihistamin profylaktiskt. Detta kan maskera de tidiga hudreaktionerna på en anafylaxi. Individer med känd/diagnosticerad urtikaria-problematik och daglig medicinering med antihistaminer bör dock ej göra uppehåll med denna.

Algoritmen bygger på den riktlinje som framtagits av Svensk förening för allergologi som reviderats 2021-11-18.

Dokumentet är utarbetat av: Eric Le Brasseur