

Dokumenttyp Instruktion	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 4	Antal sidor 1
Dokumentägare Tomas Vilhelmsson Hygiensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Smittskyddsläkare	Giltig fr.o.m. 2022-11-22	Giltig t.o.m. 2024-11-21

## Actichlor Plus

Gäller för: Hälso- och sjukvård

### Användning av Actichlor Plus

- Använd visir eller skyddsglasögon vid risk för stänk.
- Actichlor Plus innehåller både rengöringsmedel och desinfektionsmedel.
- Inverknings tiden för Actichlor Plus är 10 min. Ytorna ska vara fuktiga så länge för att garantera att sporer avdödas. Om ytan torkar innan tio minuter förflutit, torka ytan på nytt.
- Använd inte förbehandlade dukar/moppar, det reducerar klorets effekt.
- Doppa aldrig använd duk i städhink.
- Överbliven klorslösning får hällas ut i avloppet.
- Låt inte medlet torka in på glas och glaserade ytor.

### Spädning av Actichlor Plus

- Tabletten ska lösas i kallt vatten. Om varmt vatten används kan gasbildning ske.
- En tablett löses i en (1) liter kallt vatten.
- Fyll först på kallt vatten och lägg sedan i en tablett. Det tar 10–15 minuter innan tabletten är upplöst.

Färdig lösning är hållbar i 24 timmar.

[Se även Smittskydd Värmlands webbplats under Rengöring, desinfektion och sterilt gods](#)

Dokumentet är utarbetat av: Tomas Vilhelmsson