

Lathund - patient med luftvägssymtom

- Följ basala hygienrutiner!
- Patient med misstänkt smittsam luftvägsinfektion ska inte dela rum, inte vistas i väntrum eller vänta/vårdas i korridor.

	Skyddsutrustning	Placering	Övrigt
Misstanke om smittsam viral luftvägsinfektion	Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir /skyddsglasögon	Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.	Vid stark misstanke om influensa ges behandling till patient i riskgrupp i väntan på provsvar. Gäller även vaccinerade.
Kvarstående misstanke om smittsam viral luftvägsinfektion efter negativt provsvar för covid-19, influensa, RS	Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir /skyddsglasögon	Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.	Misstänkt eller konstaterad viral luftvägsinfektion - exempelvis covid-19, influensa och RS - RUT-29375 (Vida)
Påvisad covid-19, influensa eller RS-virus	Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir /skyddsglasögon	Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.	Ta ställning till behandling. Misstänkt eller konstaterad viral luftvägsinfektion - exempelvis covid-19, influensa och RS - RUT-29375 (Vida)

* Ökad smittrisk

- Långvarig vistelse i rummet, exempelvis vid vak eller personlig assistans.
- Nära kontakt med patient med kraftig hosta.
- Åtgärder som utförs nära ansiktet under en längre tid.
- Åtgärder som utförs i patientens luftväg (exempelvis bronkoskopi, intubation/extubation, trakteostomi, hjärt-lungräddning, inducerat sputum, hostmaskin, sugning av nedre luftvägar).