

Öppna jämförelser av Hälsa- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2012

Område: Hälsotillstånd, dödlighet mm

Indikator: 3. Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet

Kontaktperson: Henrik Svensson Henrik.Svensson@liv.se

Hur ligger vårt landsting till och varför: Med sjukvårdsrelaterade åtgärdbara dödsfall avses dödsfall som orsakats av sjukdomar vilka bedöms kunna påverkas genom medicinska insatser, tidig upptäckt och behandling. I måttet ingår dödsfall orsakade av till exempel stroke, diabetes och cancer i livmoderhals.

Stroke och diabetes är de diagnoser som har störst påverkan på den sjukvårdsrelaterade dödligheten, för kvinnor även cancer i livmoderhalsen. Indikatorn uppvisar en något högre dödlighet i Värmland än i riket för män, medan dödligheten för kvinnor inte avviker signifikant från den i riket som helhet.

Utfallet har förbättrats påtagligt under de senaste åren, för båda könen.

Vilka förbättringsåtgärder pågår: Strokevården i länet har utvecklats positivt under de senaste åren, vilket bland annat avspeglas i en förbättrad sekundärpreventiv behandling av blodfetter. Dödligheten vid förstagångsstroke har minskat, men är fortfarande något högre än riksgenomsnittet, vilket tydliggör behovet av ytterligare utvecklingsarbete för att erbjuda vård enligt nationella riktlinjer på strokeenhet för alla patienter i länet. En kartläggning av vårdkedjan vid stroke har genomförts under året, som en grund för ytterligare kvalitetsförbättringar.

Inom diabetesvården ses en god måluppfyllelse inom primärvården avseende blodsockerkontroll och förebyggande behandling mot komplikationer.

Ett systematiskt arbete tillsammans med länets kommuner för att förebygga insjuknande i livsstilssjukdomar samt följsamhet till nationella behandlingsriktlinjer är prioriterade områden i den långsiktiga planen för länets hälso- och sjukvård.