

Graviditetsdiabetes uppdaterad 140826

Fråga: I "[Graviditetsdiabetes – riktlinjer för uppföljning post partum](#)" står att man ska följa kvinnan på vårdcentral efter förlossningen. Vad ska man ange för diagnoser vid de besöken?

Svar: Det första vårdcentralbesöket efter förlossningen görs hos distriktsläkaren, därefter kan hon följas av sköterska varje eller vartannat år. Kvinnan har egentligen ingen sjukdom som kan diagnossättas, hon har tidigare haft "O24.9 Diabetes under graviditeten, ospecificerad" (Cosmic) eller "O24- Graviditetsdiabetes" (Profdoc) men är nu frisk.

En lämplig diagnos om man inte gör några kliniska fynd är "Z13.1 Riktad hälsokontroll avseende Diabetes Mellitus" (Cosmic) eller "Z13-P Hälsokontroll avseende specificerad sjukdom" (Profdoc). Dessa diagnoser kan sättas av såväl läkare som sköterska.

Om man t ex hittar förhöjd plasmaglukos är "R73.0 Nedsatt glukostolerans" (Cosmic) eller "R73-Latent diabetes" (Profdoc) lämplig diagnos.

Opportunistisk diabetesscreening

En närliggande fråga är hur man ska klassificera de besök som görs med anledning av den [opportunistiska screening riktad mot diabetes](#) som ska göras. Även då är det "Z13.1 Riktad hälsokontroll avseende Diabetes Mellitus" (Cosmic) eller "Z13-P Hälsokontroll avseende specificerad sjukdom" (Profdoc) som ska kodas in.