

## Spasmofen tillhandahålls ej

2020-06-12

### Läkemedel

#### **Spasmofen injektion och suppositorium**

Innehållande kodein (vattenfri), metylskopolamin, morfin, noskapin och papaverin

### Prognos

Leverantören Meda AB har slutat tillhandahålla Spasmofen suppositorium och injektion. Suppositorierna är slut hos grossist och injektion beräknas ta slut 2020-06-15.

### Alternativ

Det finns inget direkt utbytbart preparat.

**Terapigrupp Smärta Värmland** bedömer därför att NSAID (COX-hämmare) bör vara förstahandsalternativ vid behandling av gallsten och njursten. I Region Värmland rekommenderas i första hand naproxen alternativt ibuprofen (dos  $\leq 1200$  mg/dygn). Vid behov av icke-peroral beredning kan Toradol 10–30 mg s.c. eller i.v. ges.

Vid behov av opioid rekommenderas i första hand tablett morfin 5–10 mg. Vid behov av parenteral administration rekommenderas injektion morfin eller oxikodon 2,5–5 mg s.c eller i.v. Vid undantagsfall, till exempel vid kräkningar, kan Morfin APL suppositorium 5–10 mg användas. Som alternativ till Morfin APL kan, *i undantagsfall*, Ketogan suppositorium 10/50 mg vara ett möjligt alternativ. Beakta dock risken för beroendeutveckling som troligen är större för ketobemidon än för Spasmofen samt morfin.

Observera att det finns mycket begränsad dokumentation avseende den spasmolytiska komponenten i Ketogan Suppositorium.

Om det finns önskemål om att kunna ge spasmolytika finns möjlighet till tablett Papaverin 40mg eller s.c. eller i.v. injektion Buscopan 20mg/ml, 0,5–1,0 ml vid behov.

Terapigrupp Smärta Värmland

Veronica Persson, receptarie läkemedelsenheten