

EKVIANALGETISKA DOSER

Tabellerna som följer ska ses som en rekommendation och är approximativa.

De baseras på klinisk erfarenhet, FASS samt Höglandssjukhusets konverteringstabell.

De ska därför endast användas som vägledning.

Vid behandling med en opioid kan tolerans utvecklas hos patienten för den analgetiska effekten liksom för biverkningar, men patienten kan uppvisa större känslighet för annan opioid.

Vid byte från en opioid till en annan ska därför försiktighet iakttas. Angivna doser är inte rekommenderade startdoser i detta sammanhang.

Vid opioidbyte inleds förslagsvis behandlingen med den nya opioiden i en dos motsvarande 50% av den i tabellen angivna ekvianalgetiska dosen för att därefter under kontrollerade former trappas upp.

Man kan här också behöva ta hänsyn till lever- och njurfunktion samt till eventuella läkemedelsinteraktioner.

EKVIANALGETISKA DOSER peroralt korttidsverkande

- Morfin • 30 mg
- Oxycodon(OxyNorm) • 15 mg
- Kodein • 300 mg
- Tramadol • 300 mg

EKVIANALGETISKA DOSER

långtidsverkande

- Morfin (Dolcontin)
- Oxycodon (OxyContin)
- Fentanyl
- Buprenorfin (Norspan)
- 30 mg peroralt
- 15 mg peroralt
- 12 µg transdermalt
- 15 µg transdermalt

Ekvianalgetiska doser – långtidsverkande

Morfin (Dolcontin)	30 mg peroralt
Oxycodon (OxyContin)	15 mg peroralt
Fentanyl	12 µg transdermalt
Buprenorfin (Norspan)	15 µg transdermalt

Ekvianalgetiska doser – korttidsverkande

Morfin	30 mg peroralt
Oxycodon (Oxynorm)	15 mg peroralt
Kodein	300 mg peroralt
Tramadol	300 mg peroralt

Tabellerna ska ses som en rekommendation och är approximativa. De baseras på klinisk erfarenhet, FASS samt Höglandssjukhusets konverteringstabell. De ska därför endast användas som vägledning.

Vid behandling med en opioid kan tolerans utvecklas hos patienten för den analgetiska effekten liksom för biverkningar, men patienten kan uppvisa större känslighet för annan opioid. Vid byte från en opioid till en annan ska därför försiktighet iakttas. Angivna doser är inte rekommenderade startdoser i detta sammanhang. Vid opioidbyte inleds förslagsvis behandlingen med den nya opioiden i en dos motsvarande 50 procent av den i tabellen angivna ekvianalgetiska dosen för att därefter under kontrollerade former trappas upp. Man kan här också behöva ta hänsyn till lever- och njurfunktion samt till eventuella läkemedelsinteraktioner.