

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 1	Antal sidor 1
Dokumentägare Smittskydd Värmland	Fastställare Olle Wik	Giltig fr.o.m. 2014-10-29	Giltig t.o.m. 2015-10-29

Rutin om tillgång till tuberkulintest saknas

Gäller för: Lanstinget i Värmland

Vid tillgång till Tubertest

Använd detta på samma vis som vid tillgång till Tuberculin.

Observera att det är ett licenspreparat och någon vid respektive vårdcentral måste söka licens (beviljas alltid). Företaget har skickat ut en mall för beställning.

Efter att licens beviljats måste Tubertest beställas hem av lokalt apotek.

Om Tubertest också saknas, barn 2 år och äldre, Quantiferon

Om värdet $< 0,20$ bedöms det som negativt och ingen ytterligare kontroll behövs.

Om värdet är $0,20-0,90$ tas provet om efter fyra veckor. Om det då ligger under $0,20$ bedöms det som negativt. Vid fortsatt värde mellan $0,20$ och $0,90$ är man på osäker mark.

Om patienten är frisk och ingen känd tuberkulos funnits i familj eller omgivning kan man vaccinera men om det finns en beställning på Tubertest bör man invänta denna.

Om patienten har epidemiologi för TBC eller oklara symtom – röntgen pulm och remiss till barnklinik. Vid värde $> 0,9$ ska patienten remitteras till barnklinik.

Barn < 2 år

Utvärdering av Quantiferon på denna patientkategori är minst sagt sparsam och Tubertest är nog ändå att rekommendera.

OM man inte har tillgång till Tubertest så gör man som vid barn > 2 år men var ännu mer frikostig med röntgen pulm och barnklinikremiss.

Gör gärna telefonkonsultation med TB-ansvarig på barnklinik.

Utarbetad av: Olle Wik