

Dokumenttyp Instruktion	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 3	Antal sidor 1
Dokumentägare Ann-Mari Gustavsson Hygijensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Bitr. smittskyddsläkare	Giltig fr.o.m. 2019-04-11	Giltig t.o.m. 2021-05-01

Actichlor Plus

Gäller för: Hälso- och sjukvård

Användning av Actichlor Plus

- Använd visir eller skyddsglasögon vid risk för stänk.
- Actichlor Plus innehåller både rengöringsmedel och desinfektionsmedel.
- Inverkningstiden för Actichlor Plus är 10 min. Ytorna ska vara fuktiga så länge för att garantera att sporer avdödas. Om ytan torkar innan tio minuter förflutit, torka ytan på nytt.
- Använd inte förbehandlade dukar/moppar, det reducerar klorets effekt.
- Doppa aldrig använd duk i städhink.
- Överbliven klorslösning får hällas ut i avloppet.
- Låt inte medlet torka in på glas och glaserade ytor.

Spädning av Actichlor Plus

- Tabletten ska lösas i kallt vatten. Om varmt vatten används kan gasbildning ske.
- En tablett löses i en (1) liter kallt vatten.
- Fyll först på kallt vatten och lägg sedan i en tablett. Det tar 10–15 minuter innan tabletten är upplöst.

Färdig lösning är hållbar i 24 timmar.

[Se även Smittskydd Värmlands webbplats under Städ, bygg, rengöring, tvätt och avfall](#)

Dokumentet är utarbetat av: Ann-Mari Gustavsson